

核准日期：2008年12月19日
修改日期：2015年02月05日
修改日期：2018年01月15日
修改日期：2019年12月01日
修改日期：2021年02月07日
修改日期：2021年02月09日
修改日期：2021年02月18日

格列吡嗪控释片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用




【药品名称】

通用名称：格列吡嗪控释片
英文名称：Glipizide Extended Release Tablets
汉语拼音：Geliyipi Qiangshi Pian

【成份】

本品主要成份为格列吡嗪。
化学名称：5-甲基-N-[2-[[4-[(环己基)氨基]氧基]磺基]苄基]乙基]吡嗪甲酰胺。
化学结构式：



分子式： $C_{21}H_{28}N_2O_2S$
分子量：445.54

【性状】

本品为白色薄膜衣片，除去包衣后呈红色和类黄色双层片芯。

【适应症】

本品适用于作为饮食和运动治疗的辅助措施，以改善2型糖尿病患者患者的血糖控制。

【规格】

5mg

【用法用量】

本品应与早餐或当天的第一次正餐同服。
本品适用于单独饮食治疗未能控制的高血糖，即使患者已经服用本品，饮食控制仍很重要。在开始2型糖尿病的治疗时，应强调饮食控制是基本的治疗手段。对于肥胖型患者，必须限制热量，减轻体重。在控制血糖和缓解高血糖症状方面，仅靠单纯的饮食管理治疗可能无效，应强调定期规范锻炼身体重要性，辨别心血管危险因素，并采取适当的治疗措施。

如上述治疗不能缓解症状和/或降低血糖，应考虑口服磺脲类药物。如需进一步缓解症状和/或降低血糖，可考虑加用胰岛素治疗。医生和患者均应认识到本品为饮食疗法之外的附加治疗手段，它不能替代饮食治疗，也不能作为避免饮食控制的不方便因素。某些病例中，单独饮食治疗不能缓解血糖可能是暂时的，只需短期使用治疗吡嗪进行治疗。

对磺脲类药物包括格列吡嗪控释片原发性失效或继发性失效者，可考虑本品与其它口服降糖药物合用。可选择的方法包括：使用其他口服降糖药物或胰岛素替代本品。如本品已不能达到降低血糖的目的，应停止使用。须依据于常规临床和实验室检查对疗效进行判断。

考虑始发症状者使用本品时，应了解尚未确诊2型糖尿病患者的血糖能有效地预防糖尿病患者远期心血管和神经系统并发症。然而，控制胰岛素依赖性糖尿病患者血糖，可有效减缓糖尿病视网膜病变、肾病病和神经病变的进展。

【推荐剂量】

本品的推荐起始剂量为5mg，每天一次。
对本品较敏感的患者，需综合评估血糖起始后是否有低血糖反应，决定是否继续使用或停用本品。
可根据患者的血糖控制调整剂量。最大推荐剂量为20mg，每日一次。
使用本品开始治疗及治疗三个月后应测定HbA_{1c}。若检测结果表明前三个月的血糖未能充分控制，可加大剂量。之后的剂量调整应依据每三个月检测一次的HbA_{1c}水平。如果三个月的较大剂量治疗并无改善，则应恢复以往剂量。如根据空腹血糖调整剂量，调整剂量后应以间隔7天或以上的血糖测定结果，进行剂量调整至少连续两次。
接受速释格列吡嗪的患者可改为使用最近等效每日总剂量的本品治疗，每日一次。
老年患者、体弱或营养不良的患者以及肾、肝功能损害的患者，起始和维持剂量均应采取保守原则，以避免低血糖反应（参见【注意事项】部分）。

【与其他降糖药联合用药】

当在本品治疗的基础上加用其他口服降糖药用于联合治疗时，合用的药物应从最低推荐剂量开始，并密切观察患者以防低血糖。更多的信息参照合用的药物的产品信息。
当在其他口服降糖药治疗的基础上加用本品用于联合治疗时，本品可由5mg起始。低血糖风险增加的初始治疗患者应从较低剂量开始使用。
当考来维仑（colesevelam）和格列吡嗪控释片联用时，格列吡嗪的最高血药浓度和总暴露量降低。因此，本品应至少早于考来维仑4个小时给药。

胰岛素治疗的患者：和其它磺脲类药物一样，许多接受胰岛素治疗的稳定的2型糖尿病患者可安全地转换为本品治疗。从胰岛素转换为本品治疗，应考虑下列事项：
胰岛素剂量用≥20单位或以上的患者，可停用胰岛素，以常规剂量的本品开始治疗，剂量调整应间隔数天。
胰岛素剂量用≥20单位或以下的患者，胰岛素剂量应减少50%，并服用常规剂量的本品治疗，应根据患者对治疗的反应确定随后胰岛素的减量，剂量调整应间隔数天。

停用胰岛素期间，医生应每天三次检查血糖和酮体。应告知患者如果检查结果异常应立即和医生联系。对于某些患者，尤其是胰岛素剂量用超过40单位者，建议考虑住院进行治疗转换。

使用其它口服降糖药的患者：和其它磺脲类药物一样，患者改用本品时无须过度担忧。考虑到药物潜在的叠加效应，当从半衰期长的磺脲类药物（如氯磺丙脲）转换为本品时，应密切观察（1-2周）患者有无低血糖反应，或遵医嘱。

【不良反应】据文献报道

下列严重不良反应在以下和说明书其它部分有详细描述：
· 低血糖（见【注意事项】）
· 溶血性贫血（见【注意事项】）

临床试验经验

由于临床试验在不同的条件下完成，在临床试验中观察到的一种药物的不良反应率不能直接和其他药物在临床试验中的不良反应率相比较，且未必反映在实际应用中的不良反应率。

在对照及开放性临床试验中，已有580例年龄介于31-87岁的患者接受5mg到60mg格列吡嗪控释片治疗。不建议使用超过20mg的剂量。在这些试验中，约有180例患者接受本品治疗至少6个月。

表1汇总了双盲、安慰剂对照试验中报告的除低血糖以外的≥3%的不良反应发生率（接受格列吡嗪控释片治疗的患者发生百分比是在接受安慰剂治疗的患者中更常见）。

表1：在安慰剂对照临床试验中接受≥3%低血糖治疗的患者出现并在接受格列吡嗪控释片治疗的患者中更常见的不良反应的发生率（%）（不包括低血糖）

	格列吡嗪控释片 (%) N=278	安慰剂 (%) N=69
不良反应		
头晕	6.8	5.8
腹泻	5.4	0.0
神经疼	3.6	2.9
疲累	3.6	0.0
胃肠胀气	3.2	1.4

低血糖

在临床试验中接受格列吡嗪控释片治疗的580例患者中，有3.4%的患者出现低血糖（指血糖测量值<60mg/dL和或出现与低血糖有关的症状），有2.6%的患者因此中止治疗。安慰剂组患者均无低血糖报告。

胃肠道反应

在临床试验中，胃肠道（GI）副作用（恶心、呕吐、便秘、消化不良）在接受格列吡嗪控释片治疗的患者中的发生率不到3%，并且在接受格列吡嗪控释片治疗的患者中较接受安慰剂治疗的患者中更多见。

皮肤反应

在临床试验中，过敏性皮肤反应（即荨麻疹）的发生率不到1.5%，在接受格列吡嗪控释片治疗的患者中较接受安慰剂治疗的患者中更多见。这些反应可能是暂时的，尽管继续使用格列吡嗪控释片也可能不会消失；如果皮肤反应持续不退，则应停药。

实验室检查

谷丙转氨酶（ALT）、乳酸脱氢酶（LDH）、碱性磷酸酶、血尿素氮（BUN）和肌酐有轻度至中度升高。尚未确定这些异常与格列吡嗪的关系。血乳酸脱氢酶水平升高和血中原素水平升高发生率未知（不能从已获得的数据进行评估）。

服用格列吡嗪控释片的患者中，发生率小于3%的不良事件包括：

- 全身—疼痛
- 神经系统—失眠、感觉异常、焦虑、抑郁、感觉减退
- 胃肠道—恶心、消化不良、便秘、腹痛、腹泻和呕吐
- 代谢—低血糖
- 肌肉与骨骼—关节痛、腿酸疼和肌痛
- 心血管系统—晕厥
- 皮肤—出汗和痤疮
- 呼吸系统—鼻炎
- 特殊感觉—视物模糊
- 泌尿生殖—多尿
- 服用格列吡嗪控释片的患者，其它发生率低于1%的不良事件包括：
 - 全身—晕厥
 - 神经系统—肌张力增高、意识模糊、头痛、震颤、眩晕、步态异常和性欲降低
 - 胃肠道—厌食和微量便秘
 - 代谢—口渴和水肿
 - 心血管系统—心悸失常、偏头痛、潮红和高血压
 - 皮肤—皮疹和荨麻疹
 - 呼吸系统—咽炎和呼吸困难
 - 特殊感觉—眼痛、结膜炎和视网膜出血
 - 泌尿生殖—尿失禁
 - 服用格列吡嗪控释片的患者，其它发生率未知（现有资料无法确认）的不良事件包括：
 - 眼部异常—视物模糊、视觉灵敏度下降
 - 胃肠道异常—上腹部不适
 - 肝胆异常—胆汁淤积性黄疸、中毒性肝炎
 - 皮肤和皮下组织异常—过敏性皮炎、皮肤黏膜性红疹、斑丘疹
 - 先天性、家族性和遗传性异常—非急性卟啉症
 - 全身疾病和给药部位情况—不适

上市后经验

下列不良反应来自格列吡嗪控释片上市后报告。由于这些不良反应来自人数不定的人群自发报告，因此并不总是能够可靠地估计其发生率或确定与药物暴露之间的因果关系。

- 腹痛
- 胆汁淤积性和肝细胞性的肝损伤且伴黄疸
- 白细胞减少、粒细胞减少、血小板减少、溶血性贫血（见【注意事项】）、再生障碍性贫血、全血细胞减少
- 肝叶肿大和双硫仑样酒精反应
- 低钠血症和抗利尿激素异常分泌（SIADH）综合征
- 皮疹
- 已有关于在服用用于此不可溶解控释剂型的另一种药物时出现胃肠刺激和胃肠出血的报告。

【禁忌】

下列患者禁用格列吡嗪：

1. 已知对格列吡嗪或本品的任何成份有超敏反应。
2. 对磺胺衍生物有超敏反应。
3. 1型糖尿病患者，伴或不伴严重的糖尿病酮症酸中毒患者。

【注意事项】

低血糖

包括本品在内的所有磺脲类药物均会导致严重低血糖（见【不良反应】）。本品与其它抗糖尿病药物合用可能会增加低血糖风险。当与其它抗糖尿病药物合用使用时，可能需要降低本品剂量，以使低血糖风险最小化。

告知患者如何识别和处理低血糖。对本品较敏感的患者，需综合评估5mg剂量起始后是否有低血糖反应，决定是否继续使用或停用本品。身体非常虚弱或营养不良的患者，以及肾上腺、垂体或肝脏患者尤其易受抗糖尿病药物的低血糖作用影响。当无法摄取足够时、剧烈运动或运动时间过长时，或当摄入酒精时也可能出现低血糖。

患者的注意力和反应能力可能会受到低血糖的影响。在自主神经病变、老年入以及接受α受体阻滞剂或其他交感神经阻滞剂的患者中，低血糖的早期警告症状可能不同或不明显。在患者意识到低血糖之前，这些情况可能会导致严重低血糖。

在特殊技能尤为重要的情况下，例如驾驶或操作其他机械，这些损害可能会带来危险。严重低血糖可能会导致意识丧失或昏厥，还会导致脑功能暂时或永久性损害或死亡。

血糖失控

当用某种糖尿病治疗方案血糖控制稳定的患者，在一些应激情况下如：发热、外伤、感染、或手术等，均可能出现血糖失控。在这种情况下必须停用本品，改用胰岛素治疗。

任何口服降糖药物包括格列吡嗪，都可在一段时间内在许多患者身上导致降低血糖至期望水平的作用降低，可能由于“糖尿病”已发展到严重程度或对药物的反应降低。这种现象称为继发性失效。以区别于原发性失效，后者是初次给药时，药物对某个患者是无效的，在确定患者为继发性失效之前，应采取足够的剂量调节及继续坚持饮食疗法措施。

溶血性贫血

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏症患者使用本品在内的磺脲类药物可导致溶血性贫血。G6PD缺乏症患者应避免使用本品。上市后报告中，也有非G6PD缺乏症患者出现溶血性贫血的报告。

大血管事件

尚无任何临床试验证明格列吡嗪能降低大血管事件发生风险。

胃肠道疾病

格列吡嗪控释片胃肠道滞留时间如显著缩短，可能会影响其药代动力学特性，进而影响药物的临床效果。与任何其他采用同类缓释剂型技术的药物一样，对于原先存在严重胃肠道狭窄（病理或医源性）的患者，应避免格列吡嗪控释片。据个别报告，胃肠梗阻患者在服用采用此不可溶解控释剂型的另一种药物时曾出现胃肠梗阻症状。

肾功能 and 肝功能受损

没有关于肝损伤对格列吡嗪分布的影响。然而，由于格列吡嗪与蛋白高度结合，而且肝脏生物转化是本品主要的清除途径。在肾或肝损害患者中，格列吡嗪的药代动力学和药理学特性可能发生改变。如患者发生了低血糖，则低血糖的持续时间可能延长，对此应采取适当的处理措施。（见【用法用量】和【药理毒理】）。

患者须知

告知患者本品的潜在不良反应，包括低血糖。应向患者及家属解释低血糖的危险性。症状和治疗以及可能诱发低血糖的情况。还应告知患者坚持饮食治疗、规律运动和定期检测血糖控制的重要性。

告知患者本品应整片吞服，不能嚼碎、分开和碾碎。患者可能在其复诊中偶然看到类似药片的东西，本品包于不溶解的外壳内，这种设计的目的是使药物缓慢释放以便人体吸收。

【警告】

关于磺脲类药物可增加心脏病死亡风险的特别警告：已有报道与单纯饮食治疗或饮食加胰岛素治疗相比，长期磺脲药物治疗和心血管死亡率高增加。这一警告是根据UGDP（University Group Diabetes program）一项长期前瞻性临床试验得出的。该研究旨在评估磺脲类药物预防和延缓2型糖尿病患者血管并发症的有效性。该项研究共入选33例患者随机分入四个治疗组之中。

UGDP报告指出增加固定剂量的甲苯磺丁脲（1.5g/d）治疗5-8年，患者的中心导管死亡率是单纯饮食治疗者的2.5倍。由于心血管的死亡率增加，在本试验中撤出指证不上甲苯磺丁脲的患者。应对总死亡率的现象受到影响。结果未见总死亡率显著增加。尽管对如何解释这些结果存在争议，但是UGDP研究的发现仍以提出这一警告。患者应该了解格列吡嗪的潜在风险和益处以及其他可选择的替代治疗方法。

尽管上述研究只包括一种磺脲类药物（甲苯磺丁脲），考虑到该类药物作用机制和化学结构的相似性，从安全性角度考虑，应认为这一警告也适用于其它的磺脲类药物。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠

总论

基于少量已发表研究的可用数据以及格列吡嗪控释片在上市后的数十年孕妇用药经验，均没有发现任何与药物相关的主要出生缺陷、流产或不良孕产妇结局风险。但磺脲类药物（包括格列吡嗪片）曾穿过胎血并可能引起新生儿不良反应，例如低血糖。因此，必须在产期前至少两周停用本品（见**《临床注意事项》**）。妊娠期糖尿病患者也会传给胎血和胎血造成危险（见**《临床注意事项》**）。

据报道，在妊娠前患有糖尿病病的孕妇中，如果HbA1c>7%，主要出生缺陷的背景风险估计为~10%，如果HbA1c>10%，该风险则高达20-25%。该群体中估算的流产背景风险尚为未知。在美国一般人群的临床确诊妊娠病例中，主要出生缺陷和流产的背景风险分别估计为2~4%和15~20%。

临床主要事项

疾病相关的孕妇和产妇产后新生儿风险

妊娠期糖尿病控制不良会增加孕妇风险，包括糖尿病酮症酸中毒、妊娠高血压相关并发症、早产、死产和分娩并发性。糖尿病控制不良会增加胎儿风险，包括主要出生缺陷、产中以及巨大儿出生风险等。

新生儿不良不良反应

接受磺脲类药物治疗的妊娠期糖尿病患者诞下的新生儿有很大几率需要入住新生儿重症监护室，并可能出现呼吸窘迫、低血糖、产伤，以及可能是大于胎龄儿。据报道，在分娩时使用磺脲类药物的一些孕妇诞下的新生儿出现持续4-10天的长时间严重低血糖。一些半衰期长的制剂已有可能此报告。请观察新生儿是否有低血糖和呼吸窘迫的症状，并予以相应的处理。

妊娠期和产后的剂量调整

由于有报告称在分娩时使用磺脲类药物的孕妇诞下的新生儿出现长时间的严重低血糖，因此必须在产期前之前至少两周停用本品（见**《新生儿不良不良反应》**）。

哺乳

总论

如果母亲在使用本品期间哺乳婴儿，应监测婴儿是否出现低血糖症状（见**《临床注意事项》**）。虽然一项小规模临床研究没有在人类乳汁中检出格列吡嗪。但由于该研究所用检测方法存在局限性，此结果不具备决定性。有关关于格列吡嗪是否影响乳汁生成的数据，在考虑是否需要母乳喂养时，应综合权衡母乳喂养对婴儿发育和健康益处、母亲对本品的临床需求，以及本品或母亲的基础药物对婴儿的潜在不良影响。

临床注意事项

不良反应监测

如果婴儿接受母乳喂养，应监测婴儿是否出现低血糖体征（例如抖动、紫绀、窒息、体温过低、过度嗜睡、嗜睡困难、癫痫发作）。

【儿童用药】

儿童用药的安全性和有效性尚未确立。

【老年用药】

【老年用药】

本品临床研究，年龄在65岁和65岁以上患者占患者总数的33%。老年患者药物达到稳态的时间较年轻患者大约延长1-2天（详见【药理毒理】和【用法用量】部分）。

在年轻患者和老年患者之间未观察到有效性或安全性的总体差异，但不排除某些患者对药物有较高敏感性。因此，应注意老年、虚弱或营养不良的患者以及有肾功能不全者尤其易发生药物引起的低血糖。在老年人群中低血糖可能难以被认识到。另外，对于老年、虚弱或营养不良的患者以及肾或肝功能不全的患者，应谨慎决定起始及维持剂量以避免低血糖反应。

【药物相互作用】

【药物相互作用】

影响葡萄糖代谢的药物

多种药物可影响葡萄糖的代谢，因此可能需要调整本品的剂量并密切监测低血糖及控制血糖恶化情况。以下可增加格列吡嗪控释片的降糖作用、增加发生低血糖的可能性和/或严重程度药物：抗糖尿病药物、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素II受体阻滞剂、吡唑类、贝特类、氟西汀、单胺氧化酶抑制剂、己酮可可碱、普兰林肽、丙氧芬、水杨酸、生长激素类似物（如奥曲肽）、磺胺类抗生素、非甾体抗炎药、氨基糖、丙磺舒、香豆素、伏立康唑、H2受体拮抗剂和唑啉酮类。当服用本品的患者接受这些药物治疗时，应密切监测低血糖情况。当服用本品的患者使用这些药物时，应密切监测及控制血糖恶化情况。

以下可降低格列吡嗪控释片的降糖作用，导致血糖恶化的药物：非典型抗精神病药（如奥氮平和氯氮平）、皮质类固醇、达那唑、利尿剂、雌激素、胰高血糖素、异烟肼、烟酸、口服避孕药、吡喹酮、孕激素（如口服避孕药）、蛋白酶抑制剂、生长激素、拟交感神经药（如肾上腺素、肾上腺素、特布他林）、甲状腺激素、茶苯胺、烟酸和钙通道阻滞剂。当服用本品的患者使用这些药物时，应密切监测及控制血糖恶化情况。当服用本品的患者使用这些药物时，应密切监测低血糖情况。

酒精、β-受体阻滞剂、可乐和利血平可能会增强或减弱格列吡嗪控释片的降糖作用。本品与这些药物合用时可能需要增加监测频率。

服用交感神经抑制药物如β-受体阻滞剂、可乐定、乙酰胆碱和利血平的患者的低血糖症状可能减弱或消失。本品与这些药物合用时可能需要增加监测频率。

咪唑啉

当格列吡嗪控释片与咪唑啉合使用时，必须密切监测患者的低血糖。有报道，口服咪唑啉和降糖药物之间可能出现相互作用导致严重低血糖。咪唑啉静脉、局部或阴道给药时是否有此种相互作用尚不清楚。

氟康唑

当格列吡嗪控释片与氟康唑合使用时，必须密切监测患者的低血糖。合并使用氟康唑治疗会增加格列吡嗪的药物浓度，因而可能导致低血糖（见【药理毒理】）。在健康志愿者中进行了安慰剂对照、交叉试验以研究了大扶康®（氟康唑）和格列吡嗪合使用的效应。所有受试者首先单独服用格列吡嗪，然后给予大扶康®100mg每天一次共7天。使用氟康唑之后，格列吡嗪的药时曲线下面积（AUC）平均增加了56.9%（范围35-81%）。

伏立康唑

尽管没有进行相关研究，伏立康唑有可能增高磺脲类（例如：甲苯磺丁脲、格列吡嗪、格列本脲）的药物浓度，而导致低血糖。建议在联合用药时，应仔细监测血糖情况。

考来维仑

本品至少在服用考来维仑4小时之前服用。当两种药物合给给药时，考来维仑可降低格列吡嗪的血药浓度及总暴露量（见【药理毒理】）。在健康志愿者中评估考来维仑对格列吡嗪控释片药代动力学影响的研究中，观察到考来维仑和格列吡嗪控释片联用时，格列吡嗪AUC_{0-12h}和C_{max}分别降低12%和13%。当格列吡嗪控释片早于考来维仑4小时给药时，格列吡嗪AUC_{0-12h}和C_{max}无显著变化（分别在-4%和0%之间）。因此，本品应至少早于考来维仑4

小时给药，以确保考来维仑不缺少格列吡嗪的吸收。

【药物过量】

包括本品在内的磺脲类药物过量可导致严重低血糖。没有意识丧失或神经系统表现的轻度低血糖症状应给予口服葡萄糖治疗。严重低血糖应伴有昏迷、惊厥或其它的神经损害症状必须立即给予治疗的紧急医疗情况。患者应接受提高血糖率或静脉葡萄糖治疗。应严密监测患者至少24-48小时，因临床症状明显好转后再次发生低血糖。肝脏疾病的患者血浆格列吡嗪的清除会延长。由于格列吡嗪大部分与蛋白结合，透析可能不会取得效果。

【药理毒理】

格列吡嗪主要通过刺激胰岛分泌胰岛素来达到降血糖作用，其作用依赖于胰岛β细胞的功能。磺脲类药物通过与胰岛β细胞膜上的磺脲受体结合，引起ATP-敏感的钾离子通道关闭，从而刺激胰岛素的释放。

毒理学研究

遗传毒性：细菌体内致突变试验均为阴性。

生殖毒性：在雌雄小鼠的研究中，剂量达人体剂量的75倍时，未见对生育力的影响。大鼠围产期生殖毒性研究中发现有剂毒性（5-50mg/kg），均有轻度胚胎毒性。与其磺脲类药物如甲苯磺丁脲和羧拉磺脲中观察到的胚胎毒相似。认为与格列吡嗪降低血糖的药理作用直接相关。

致癌性：在大鼠20个月和18个月的研究中，剂量达人体大剂量的75倍时，未见药物相关的致癌作用。

【药代动力学】

2型糖尿病患者口服单剂格列吡嗪，绝对生物利用度为100%。口服本品后2-3小时血液浓度开始升高，6-12小时内达到高峰。连续每次口服一次本品，在24小时内的剂量间隔中格列吡嗪浓度维持了有效的血液药浓度，峰谷波动明显低于每日多次的格列吡嗪速释片。
21例男性2型糖尿病患者服用20mg本品，与格列吡嗪速释片（10mg每日两次）相比，稳态下格列吡嗪明显片相对生物利用度平均为90%。21例小于65岁男性2型糖尿病患者，服用本品第5天后达到稳态血液浓度。
2例女性老（>65岁）男性和女性2型糖尿病患者达到稳态的时间较后1延1-2天。2型糖尿病患者长期使用本品未发现药物累积现象。

本品和食物同时服用对药物吸收无影响（2-3小时）无影响。21例健康男性受试者服用剂量食物影响研究显示，高脂早餐后服用本品，格列吡嗪平均血液浓度增加40%，有显著意义。但对药时曲线下面积（AUC）的影响不显著。进食和空腹状态下服用本品，血糖的反应没有差别。胃肠停留的时间如显著缩短（例如胆肠综合症），将会影响本品的药代动力学特性而引起导致血液浓度降低。

26例男性2型糖尿病患者多剂量研究显示，给予本品后，格列吡嗪的药代动力学呈线性，即血药浓度随剂量增加而成比例的增加。2例健康受试者单剂量的研究提示，4片5mg、2片10mg和1片20mg本品具有生物等效性。

【给药】

2型糖尿病患者经静脉给予单剂量本品后，平均表现分布容积约为10升。98-99%的格列吡嗪与血清蛋白（主要是白蛋白）结合。

代谢

格列吡嗪的主要代谢产物是芳香羟基化反应产物，无降糖活性。次要代谢产物乙酰基苯基苄基生物约占服用剂量的2%以下，据报道其降糖活性为母体化合物的1/10-1/3。

排泄

格列吡嗪主要通过经肾脏生物转化而清除，少于10%剂量的格列吡嗪以原形从尿和粪便中排出，约90%的剂量经过生物转化后从尿（80%）和粪便（10%）排出。

2型糖尿病患者经静脉给予单剂量格列吡嗪后，平均总清除率约为每小时3升。2型糖尿病患者单剂和多次给药后，格列吡嗪的平均清除半衰期为2-5小时。

特定人群

儿童

尚未评估格列吡嗪在儿童患者中的药代动力学。

老年人

与年轻健康受试者相比，老年糖尿病患者受试者单剂服用格列吡嗪后，药代动力学参数无显著差别。

肾功能受损

没有对各种肾功能损害的患者进行格列吡嗪的药代动力学研究。有限数据表明，格列吡嗪生物转化产物在肾功能损害受试者的循环系统中的保留时间可能在肾功能正常受试者中的保留时间长。

肝功能受损

尚未在肝功能受损的患者中展开格列吡嗪的药代动力学研究。

【贮藏】密封，30℃以下防潮保存。

【包装】聚酰胺/铝/聚酰胺/铝冲成型固体药用复合硬片和药用铝箔。

7片板×2板/盒；7片板×3板/盒；7片板×4板/盒；7片板×6板/盒；7片板×7板/盒；7片板×8板/盒；10片板×3板/盒；10片板×6板/盒。

【有效期】

【有效期】

【执行标准】国家药品监督管理局标准YBH04092021

【批准文号】国药准字J20084634

【上市许可持有人】

名称：北京红林制药有限公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

邮政编码：101407

联系方式：010-61669962

网 址：http://www.oshl.com

网 址：http://www.oshl.com

【生产企业】

企业名称：北京红林制药有限公司

生产地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

邮政编码：101407

联系方式：010-61669962

传真号码：010-61669843

网 址：http://www.oshl.com