

法莫替丁钙镁咀嚼片说明书**请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用****[药品名称]**

通用名称：法莫替丁钙镁咀嚼片

英文名称：Famotidine, Calcium Carbonated and Magnesium Hydroxide Chewable Tablets

汉语拼音：Famotiding GaiMei Jujue Pian

[成份] 本品为复方制剂，每片含法莫替丁10毫克、碳酸钙800毫克、氢氧化镁165毫克。辅料为：乙基纤维素（20cps）、聚维酮K30、微晶纤维素、阿斯巴甜、甘露醇、乳糖、橙味掩味剂、薄荷粉末香精、硬脂酸镁、胭脂红、诱惑红、乙醇、纯化水。**[性状]** 本品为白色至粉色片。**[作用类别]** 本品为抗酸类非处方药药品。**[适应症]** 适用于缓解成人及12岁以上儿童由于胃酸过多引起的胃灼热（烧心）、反酸、胃疼、胃部不适等症。**[规格]** 每片含法莫替丁10毫克、碳酸钙800毫克、氢氧化镁165毫克。**[用法用量]** 咀嚼服用，一次1片，一日1~2次。24小时内不超过2片。**[不良反应]** 少数患者可有头痛、头晕、失眠、便秘和腹泻；偶有皮疹、荨麻疹等；罕见食欲不振、白细胞减少、轻度一过性转氨酶升高、心跳过快、血压升高、颜面潮红及月经不调等。**[禁忌]**

1. 对本品过敏者禁用。
2. 有吞咽障碍者禁用。
3. 严重肝肾功能不全者禁用。

[注意事项]

1. 本品连续使用不得超过7天，胃痛等症状未缓解或消失，请咨询医师或作进一步检查。
2. 肝功能不全患者应慎用。
3. 本品主要成份法莫替丁主要由肾脏排泄，肾功能不全的患者应慎用。
4. 12岁以下儿童应在医师指导下使用。
5. 孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
6. 本品不要与其他制酸剂或抗酸剂合用。
7. 24小时内药量不超过2片。
8. 除肝肾功能不全以外的老年患者，服用本品一般不需要进行剂量调整。
9. 如有突发的，不明原因的恶心，呕吐，上腹疼痛，应及时去医院就诊。
10. 有中枢神经系统病史和神经病史的患者应在医师指导下使用。
11. 用药后如出现皮疹等过敏反应，应立即停药。
12. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
13. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
14. 本品性状发生改变时禁止使用。
15. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
16. 儿童必须在成人监护下使用。
17. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 本品中的法莫替丁不抑制肝药物代谢酶，与其他药物相互作用不明显。本品对茶碱、苯妥英钠、华法林、硝苯吡啶及地西洋等药代有轻度影响，不影响普鲁卡因胶等在体内的分布。
2. 本品与四环素类或氟喹啉类药物联合服用时会降低后者的吸收，可能是因为抗酸剂的存在易使该类物质发生螯合作用。
3. 本品与维生素D类似物联合服用时易导致高血钙的发生。
4. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用]

本品是由法莫替丁、碳酸钙、氢氧化镁组成的复方制剂。法莫替丁为组胺H₂受体拮抗剂，对胃酸、胃蛋白酶分泌有抑制作用，能减少胃酸的产生。碳酸钙与氢氧化镁是抗酸药，能中和已经产生的胃酸。三者共同作用达到减轻胃灼热（烧心）症状的作用。

[贮藏] 遮光，密封，在30℃以下的干燥处保存。**[包装]** 纸铝复合膜包装，每盒6片；

纸铝复合膜包装，每盒8片；

纸铝复合膜包装，每盒10片；

纸铝复合膜包装，每盒12片；

纸铝复合膜包装，每盒16片；

纸铝复合膜包装，每盒24片；

药用口服固体高密度聚乙烯瓶装，每瓶12片；

药用口服固体高密度聚乙烯瓶装，每瓶30片；

铝塑包装，每盒6片；

铝塑包装，每盒8片；

铝塑包装，每盒10片；

铝塑包装，每盒12片；

铝塑包装，每盒16片；

铝塑包装，每盒24片。

[有效期] 24个月**[执行标准]** 国家食品药品监督管理局标准WS₁-XG-016-2016**[批准文号]** 国药准字H20080048**[说明书修订日期]** 2020年02月19日**[上市许可持有人]**

名称：北京红林制药有限公司

地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

[生产企业]

企业名称：北京红林制药有限公司

生产地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

邮政编码：101407

电话号码：010-61669962

传真号码：010-61669843

网 址：www.osihl.com

如有问题可与生产企业联系